







Pré-grossissement


Mortalité cumulée *
30 %




Croissance : **+1,9 g**
Poids individuel moyen * : $2,3 \pm 1,0$ g




Grossissement sur corde




Pertes cumulées*
12 % (+5%)



Croissance : **+17 g**
Poids individuel moyen* : 53 ± 18 g



Indice de qualité*
14




*période : mars-mai 2023. Mortalité/pertes cumulées, poids individuel moyen, indice de qualité : mai 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres. La croissance correspond à l'évolution du poids individuel moyen depuis la saison précédente.



Huîtres plates


Naissain 2022



Mortalité cumulée *
40 % →


Croissance* : **+1,6 g** ↗
Poids individuel moyen 5,4 ± 2,3 g

Naissain 2021



Pertes cumulée *
51 % (+6%) ↗

Moules – taux de remplissage



Lancement le 23/03/2023 d'une nouvelle série de demi-moules originaires de l'étang de Thau aux points Bouzigues et Marseillan



Ce qu'il faut retenir

- Des naissains d'huîtres creuses ont été mis à l'eau le 23/03/2023 en lanternes et pearl nets. **La mortalité printanière sur le naissain a été importante au mois de mai** (30% de mortalité cumulée) quelle que soit la zone d'élevage avec plus de mortalité sur le naissain naturel d'Atlantique.
- Les pertes cumulées sur cordes ont été relativement faibles** avec des pertes plus importantes sur les huîtres issues du captage naturel de 2022 à Thau. Comme identifié cet hiver, ceci est probablement dû au collage trop précoce des huîtres sur corde après détachement. Les mortalités les plus faibles ont été observées sur les huîtres naturelles d'Atlantique.
- On constate une **reprise importante de la croissance des huîtres sur cordes durant le printemps**. Les plus fortes croissances ont été observées sur les huîtres triploïdes, toutes zones confondues.
- Les lots d'**huîtres plates** de 2021 et de 2022 se maintiennent, avec pas ou peu de mortalité ce printemps. Le naissain de 2022 en lanterne croît plus que cet hiver.
- Un nouveau lot de demi-moules a été mis à l'eau en mars pour reprise des suivis du taux de remplissage des moules de l'étang aux points Bouzigues et Marseillan.

*période : mars-mai 2023. Mortalité/pertes cumulées, poids individuel moyen : mai 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres. La croissance correspond à l'évolution du poids individuel moyen depuis la saison précédente.