







Pré-grossissement


Mortalité cumulée *
41 % (+11%) ↗




Croissance : +7,3 g
Poids individuel moyen * : 9,6 ± 5,3 g




Grossissement sur corde




Pertes cumulées*
35 % (+23%) ↗



Croissance : +31 g ↗
Poids individuel moyen* : 84 ± 41 g



Indice de qualité*
10 (-4) ↘




*période : juin-août 2023. Mortalité/perces cumulées, poids individuel moyen, indice de qualité : août 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres. La croissance correspond à l'évolution du poids individuel moyen depuis la saison précédente.



Huîtres plates

Lot de 2023

Mise à l'eau du naissain le 23/06/2023




Mortalité cumulée *
51 %

Croissance* : **+4,1 g**
Poids individuel moyen T0 : 0,5 ± 0,2 g




Moules – taux de remplissage



Lot de 2022

Collage sur corde le 06/06/2023



Pertes cumulée *
7 %

Croissance* : **+18 g**
Poids individuel moyen : 31 ± 11 g



Ce qu'il faut retenir

- Les mortalités estivales sur le naissain d'huître creuse ont augmenté de juin à août suite au pic de mortalité de mai (+11% de pertes par rapport au printemps). Les plus importantes ont été relevées à Bouzigues avec une moyenne de 47% de pertes. Ce résultat s'explique en partie par une forte mortalité du naissain triploïde sur ce site (59%).
- Les pertes cumulées d'huîtres creuses sur cordes ont été plus importantes avec une augmentation des pertes de 23%. Globalement, le parc de Marseillan a été le moins touché (31% contre 36% et 37% pour Bouzigues et Mèze). Les plus grosses pertes ont été relevées sur les individus triploïdes de Bouzigues (46%) et Marseillan (43%).
- La croissance des huîtres creuses sur cordes a été importante. Les plus fortes ont été observées sur les huîtres triploïdes de Bouzigues et de Marseillan. De plus l'indice de qualité des huîtres creuses a diminué de juin à août tout au long des pontes de l'été.
- Le lot d'huîtres plates de 2022 a été collé sur corde le 06/06/2023 et présente une belle croissance (+18g) en particulier sur Bouzigues (+28g). Un nouveau lot de naissain d'huître plate a été mis en eau le 23/06/2023 et a enregistré de fortes mortalités dès juillet (51%).
- Le taux de remplissage des moules d'étang mises à l'eau en mars dernier a augmenté de juin à août avec un taux de remplissage plus important sur Bouzigues.

*période : juin-août 2023. Mortalité/pertes cumulées, poids individuel moyen : août 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres. La croissance correspond à l'évolution du poids individuel moyen depuis la saison précédente.

Contacts

Camille Grosjean
grosjean@cepralmar.org
06.30.12.83.76 - Cépralmar

Théo Lancelot
tlancelot@cepralmar.org
06.45.92.05.77 - Cépralmar

Les données présentées sont issues de l'observatoire conchylicole du Cépralmar avec le soutien de :