





### Bilan pré-grossissement mars - octobre 2023

Pertes cumulées finales

**44 % (+3%)**

Poids individuel moyen final :

**18 ± 9,7 g**





### Bilan grossissement sur corde octobre 2022 - septembre 2023

Pertes cumulées finales


**38 % (+3%)**

Poids individuel moyen final :

**85 ± 21 g**



### Grossissement sur cordes série 2023-2024



Pertes cumulées\* : **2,4%**  
Poids individuel moyen\* : **23 ± 8,5g**


\*période : octobre-décembre 2023. Pertes cumulées, poids individuel moyen : décembre 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres.



Bilan des huîtres creuses pré-grossies :  
17/10/2023  
Collage des huîtres pré-grossies : 25/10/2023  
Densité : 30 huîtres/mètre




### Huîtres plates 2023 en lanterne




Pertes cumulées\* : **58%** →  
 Poids individuel moyen\* : **12 ± 4,9g** ↗

### Huîtres plates 2022 sur corde



Pertes cumulées\* : **21%** ↗  
 Poids individuel moyen\* : **49 ± 20g** ↗

### Moules – taux de remplissage



Arrêt du suivi de moules à Marseillan en novembre après passage de dorades dans nos filets de protection

\*période : octobre-décembre 2023. Pertes cumulées, poids individuel moyen : décembre 2023. Les pertes cumulées comprennent la mortalité et le décrochage des huîtres.

### Captage naturel à Thau : bilan du captage 2023



Le captage naturel 2023 a été moins important que celui de 2022. Les collecteurs ont été détrouqués début octobre 2023. Les résultats obtenus sont les suivants :

• Nombre estimé d'individus par coupelle après détrouquage :

	Captage 2022	Captage 2023
Bouzigues	16,5	5
Lycée de la mer	62	50

• Taille/poids moyens captage de Bouzigues : 45mm pour 10g  
 Le naissain capté sur la table de Bouzigues a été collé le 06/11/2023.

- Ce qu'il faut retenir**
- Le naissain pré-grossi en lanterne depuis mars a été collé fin octobre 2023. Les pertes cumulées à l'issu de cette phase sont de **44%** sur l'ensemble de l'étang, ce qui est inférieur au résultat de 2022 qui était de **48%**. Les pertes les plus importantes ont été observées sur les huîtres triploïdes de Bouzigues (60%) et les plus faibles sur les huîtres triploïdes de Mèze (36%) et de Marseillan (26%). Le poids individuel moyen des huîtres lors de leur collage sur corde était de 18,1g.
  - Les huîtres creuses sur corde ont été détrouquées fin septembre 2023. Les pertes cumulées lors de la phase de grossissement sur corde s'élèvent à **38%** sur l'ensemble de l'étang. Les plus importantes ont été observées pour les huîtres triploïdes des zones de Bouzigues et de Marseillan (47%). Et les plus faibles sur les huîtres naturelles d'Atlantique de Marseillan (25%). Côté croissance, ce sont les huîtres triploïdes tous sites confondus qui présentent un poids unitaire moyen de 134g. Les huîtres naturelles de Thau présentent les poids unitaires moyen les plus faibles avec une moyenne de 62g.
  - Le lot d'huîtres plates de 2022 collées sur corde en juin 2023 présente une belle croissance (+36g depuis juin) en particulier sur Mèze et Bouzigues. Cependant, les pertes cumulées observées sont très hétérogènes avec un maximum de 31% à Marseillan. Le lot d'huîtres plates 2023 mis à l'eau en juin dernier présente quant à lui des pertes stables et une croissance moyenne de +11,5g.
  - Le taux de remplissage des moules d'étang mises à l'eau en mars dernier a augmenté entre octobre et décembre sur la table de Bouzigues.